

Informationsblatt für Besitzer

## Unsere Impfempfehlung nach StIKo

Ein immer wiederkehrendes Thema ist die Impfung der Hunde und Katzen. Was sollte, was muss geimpft werden und vor allem wie oft und in welchen Abständen?

Die StIKo (Ständige Impfkommission) gibt Impfempfehlungen heraus, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, die immunologische Reaktionen und eventuelle Nebenwirkungen mit einbeziehen. Denn es gilt der Leitspruch „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“.

### Hund

	8 Wo.	12 Wo.	16 Wo.	15 Mo.	jährlich	Alle 3 Jahre
Staupe	x	x	x	x		x
Parvovirose	x	x	x	x		x
Hcc	x	x	x	x		x
Leptospirose	x	x		x	x	
Tollwut		x				x

### Staupe, Parvovirose, ansteckende Leberentzündung (Hcc)

Gerade bei Wildtieren (Füchse, Marder, Waschbären) kommt es immer wieder zu Krankheitsausbrüchen, die somit eine Infektionsquelle für unsere Haustiere darstellen.

### Leptospirose

Die Übertragung erfolgt v.a. über warme, flache stehende Gewässer (flache Teiche und Tümpel, große Pfützen), kann also v.a. im Sommer, wenn es warm ist und die Tiere viel baden, auftreten. Wir impfen mit einem neuen Impfstoff, der gegen die 4 häufigsten Stämme schützt, dennoch kann eine Infektion mit einem noch nicht impfmöglichen Stamm erfolgen.

### Tollwut

Bei Hunden wird die Impfung gegen Tollwut verlangt. Impfersteller beschreiben eine einmalige Impfung mit 12 Wochen und dann alle 3 Jahre. Je nach Impfersteller kann eine Impfung mit 15 Monaten notwendig sein.

Sollte es zu einem Kontakt mit einem Tollwut- infizierten Tier kommen, kommen geimpfte Tiere in Quarantäne, ungeimpfte Tiere werden in diesem Fall sofort euthanasiert.

### Schnelltest Impftiter

Auf dem Markt gibt es einen Titer-Schnelltest mit dem sich der Titer von Staupe, Parvovirose und HCC über das Blut überprüfen lässt. Diesen kann man nutzen, um zu überprüfen, ob diese Impfung nach 3 Jahren notwendig ist. Sollte der Titer ausreichend sein, muss dieser natürlich jährlich überprüft werden. Dieser Test ist bei uns nicht vorrätig, sollten Sie hier Bedarf haben, können wir diesen bestellen. Sprechen Sie uns hier bitte einfach an.

**Katze:**

	8 Wo.	12 Wo.	16 Wo.	15 Mo.	- Freigänger jährlich - Hauskatzen alle 2 Jahre	Alle 3 Jahre
Katzenschnupfen (RC)	x	x	x	x	x	
Katzenseuche (P)	x	x	x	x		x
Tollwut		x				x

**Katzenseuche/ Katzenschnupfen**

Eine Impfung wird auch bei reinen Wohnungskatzen empfohlen, da eine Übertragung auch über verunreinigte Kleidung der Besitzer erfolgen kann.

**Tollwut**

Bei Katzen wird die Impfung gegen Tollwut für Freigänger dringend empfohlen. Die Empfehlung ist hier wie beim Hund zu handhaben.

Info: Dadurch, dass die Impfung bei Hauskatzen für RC 2 Jahre anhält, impfen wir hier alle 2 Jahre RCP.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

**Tierarztpraxis Rosin Berlin**

T +49 30 339 376 00 | E [praxis@tierarzt-rosin.de](mailto:praxis@tierarzt-rosin.de)

**Tierarztpraxis Rosin Falkensee**

T +49 3322 42 64 64 | E [praxis@tierarzt-rosin.de](mailto:praxis@tierarzt-rosin.de)

Stand 01.02.2020

